



Southwest Gastroenterology, P.A.

Tony N. Tsen, M.D.

Liver and Digestive Disease Specialist

Board Certified in Gastroenterology and Internal Medicine

Instrucciones SuTab Para Colonoscopia

Lea Todas Las Instrucciones Antes De Comenzar

Su cita está programada para el _____ a las _____ am / pm
Esté en GRMC / Christus Santa Rosa antes de: _____ am / pm

3 días antes de su procedimiento, deje de tomar vitaminas, pastillas de hierro, anticoagulantes (no incluye medicamentos para la presión arterial), formadores de heces como lmodium y suplementos de fibra. A menos que se le indique previamente, no tome medicamentos de rutina el día del procedimiento. *** Recomendamos comprar SuTab cinco días antes del procedimiento. *** (La receta se puede surtir en la mayoría de las farmacias locales).

Su médico le ha recetado la solución SuTab como preparación para la limpieza intestinal antes de su colonoscopia. SuTab viene empaquetado con un recipiente de 16 onzas y dos botellas de pastillas. Siga estas instrucciones con mucho cuidado para garantizar una preparación intestinal limpia antes de su colonoscopia:

Todo el día del día antes de su procedimiento: Empiece con una dieta de líquidos claros (sin alimentos sólidos). Los líquidos claros incluyen: caldo de pollo o carne de res, agua, jugo de manzana, Gatorade, jugo de uva blanca, refrescos, café y té (sin leche ni crema ni láctea), bebida de naranja (Hi-C - Crystal Lite), gelatina, caldo, paletas heladas y limonada. **NO BEBA LECHE NI PRODUCTOS LÁCTEOS. NO BEBA NADA ROJO O MORADO. SIN PRODUCTOS DE TABACO LA MAÑANA DE SU PROCEDIMIENTO.**

A las 11:00 a.m. La mañana de antes del procedimiento, comience a beber SuTab. Llene la taza con agua potable hasta la línea de 16 onzas y comience a tomar las 12 pastillas de la primera botella. Tome cada pastilla con aproximadamente 2 minutos de diferencia con agua. Debe beber dos recipientes más de 16 onzas de agua después de completar las pastillas. **ESTO ES OBLIGATORIO**. Después de beber su primera dosis de preparación, puede continuar con la dieta de líquidos claros.

A las 11:00 p.m. La noche antes del procedimiento, comience a beber la segunda dosis de SuTab. Llene la taza con agua potable hasta la línea de 16 onzas y comience a tomar las 12 pastillas de la primera botella. Tome cada pastilla con aproximadamente 2 minutos de diferencia con agua. Debe beber dos recipientes más de 16 onzas de agua después de completar las pastillas. **ESTO ES OBLIGATORIO**. Después de completar la preparación, tome 2 cápsulas de Gas-X para reducir el gas. **NO COMA NI COMA NI BEBA MÁS DESPUÉS DE ESTO.**

Recuerde: No coma alimentos sólidos, beba productos lácteos ni consuma nada rojo o morado el día antes de su procedimiento. Preséntese en la instalación, indicada arriba, y traiga a alguien que pueda llevarlo a casa de manera segura. Debido a la sedación administrada durante el procedimiento, no se le permitirá conducir a la salida (NO taxi). **Necesitará que alguien lo lleve a su casa.**

Tenga en cuenta: Llame al hospital dos días antes de su procedimiento para preinscribirse:
GRMC: 830-379-2411 o Christus Santa Rosa: 830-643-8600 o Otto Kaiser: 830-583-3401

911 S State Hwy 123 Bypass • Seguin, Texas 78155 • Phone 830.372.9042

• Fax 866.381.1095 • P.O. Box 2256 • Seguin, Texas 78156